

ARA 3000 beta®



Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires :

Une seringue de 5 ml contient :

Substances actives :

Acide oléique 43,75 mg

Acide palmitique 27,00 mg

Acide stéarique 20,00 mg

Forme pharmaceutique:

Gel injectable.

Espèce cibles:

Chiens.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles:

Chez le chien :

- traitement symptomatique de l'arthrose.

Contre-indications:

Non connues.

Mises en garde particulières à chaque espèce cible:

Aucune.

Précautions particulières d'emploi chez les animaux:

L'administration préalable d'anesthésique local au point d'injection est nécessaire pour minorer la douleur provoquée par l'injection de la spécialité.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux:

En cas d'auto-injection, une sensation de douleur transitoire et l'apparition de lésions de nécrose/inflammation sont attendues au point d'injection.

La spécialité contient de l'huile d'arachide. L'arachide peut provoquer une hypersensibilité (allergie) suite à son injection, inhalation, ingestion, ou à un contact cutané. En cas d'hypersensibilité, éviter tout contact avec le produit.

En cas d'apparition d'érythème cutané, prendre l'avis d'un médecin.

En cas d'apparition d'œdème du visage, des lèvres, des yeux ou en cas d'apparition d'une difficulté respiratoire, consulter immédiatement un médecin.

Autres précautions:

Aucune.

Effets indésirables (fréquence et gravité):

L'injection de la spécialité chez le chien provoque une forte douleur. Dans certains cas, une légère tuméfaction peut être observée sur le site d'injection.

Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte:

L'innocuité de la spécialité chez les chiennes pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. L'utilisation de la spécialité chez les chiennes pendant la gestation et la lactation est déconseillée.

Interactions médicamenteuses et autres:

Non connues.

Posologie:

3 injections de 2,2 mg d'acide oléique, 1,35 mg d'acide palmitique et 1 mg d'acide stéarique par kg de poids corporel (soit 1 ml de gel pour 4 kg de poids corporel), à une semaine d'intervalle, par voie intramusculaire profonde (muscles lombaires).

Le volume maximal à injecter est de 10 ml par animal et 5 ml par point d'injection.

voie d'administration:

Voie intramusculaire profonde (muscles lombaires).

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes):

Non connu.

Temps d'attente:

Sans objet.

Propriétés pharmacodynamiques:

La spécialité est constituée d'acides gras. Administrée par voie intramusculaire, elle agit par inhibition de phénomènes observés dans les réactions inflammatoires (production des leucotriènes et dégranulation des mastocytes).

Caractéristiques pharmacocinétiques:

Les acides gras de la spécialité une fois administrée au chien sont incorporés dans le cycle métabolique normal des acides gras endogènes de l'organisme.

Incompatibilités:

Non connues.

Durée de conservation:

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 2 ans.

Précautions particulières de conservation selon pertinence:

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

Maintenir le conditionnement primaire dans l'emballage extérieur afin de conserver à l'abri de la lumière.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments:

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant:

SEXMOOR
ZA de la Massane
13210 SAINT REMY DE PROVENCE

Numéro d'autorisation de mise sur le marché et date de première autorisation:

FR/V/8678552 1/1985 - 30/05/1985 - 09/02/2010

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance:

Sans objet.

Classification ATC Vet:

QM01A

Boe de 30 seringues auto-injectables de 2 ml
GTIN : 03700469900077

Boe de 30 seringues auto-injectables de 5 ml
GTIN : 03700469900053

Boe de 30 seringues auto-injectables de 10 ml
GTIN : 03700469900015

Sachet de 6 seringues auto-injectables de 2 ml
GTIN : 03700469900176

Sachet de 6 seringues auto-injectables de 5 ml
GTIN : 03700469900190

Sachet de 6 seringues auto-injectables de 10 ml
GTIN : 03700469900206

Laboratoire SEXMOOR

ZA de la Massane
497 avenue de la Massane
13210 SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
Tél : 04 90 92 19 96 / 04 90 92 17 79
Fax : 04 90 92 54 87

contact@sexmoor.com
www.sexmoor.com

