

# ENERLYTE® Plus

## Type et catégorie d'aliment - Eventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu:

Aliment complémentaire diététique pour veaux et porcelets : stabilisation du bilan des électrolytiques et de l'eau afin de faciliter la digestion physiologique.  
Poudre orale effervescente.

## Composition par ordre de poids décroissant:

### Composition :

Lactose, bicarbonate de sodium, poudre de lactosérum, chlorure de sodium, chlorure de potassium, farine de riz.

### Constituants analytiques :

Protéines brutes ..... 5,4 %  
Cellulose brute ..... < 2 %  
Matières grasses brutes ..... 1,1 %  
Cendres brutes ..... 18,3 %  
Sucres totaux ..... 73,84 %  
Lysine ..... 0 %  
Méthionine ..... 0 %  
Sodium ..... 6,24 %  
Potassium ..... 2,11 %  
Chlorure ..... 4,18 %  
Bicarbonate ..... 9,65 %

## Liste des additifs :

### Additifs par kg

#### - Additifs sensoriels :

Substances aromatiques (2b) :

Glycine ..... 45 800 mg

Vanilline ..... 300 mg

#### - Additifs nutritionnels :

. Vitamines, pro-vitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies (3a) :

3a700. Vitamine E ..... 500 mg

. Composés d'oligo-éléments (3b) :

3b8.11. Sélénométhionine (produit par *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R 397 (levure sélénée inactivée)) ..... 500 mg (1-1,2 mg de sélénium)

#### - Additifs zootechniques :

Stabilisateur de la flore intestinales : Micro-organismes (4b) :

E1705. *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 CYLACTIN ..... 5.10<sup>10</sup> UFC

#### - Additifs technologiques :

Agent émulsifiant, de stabilisation, épaississant et gélifiant :

Farine de caroube, E410 ..... 10 g

## Utilisation:

À utiliser en cas de risque de troubles digestifs (diarrhée) pendant et après ceux-ci.

Il est recommandé de prendre conseil auprès d'un vétérinaire avant l'utilisation du produit et avant d'en étendre sa durée d'utilisation.

L'alimentation lactée simultanée devrait être évitée chez les animaux possédant un abomasum.

## Mode d'emploi:

### Voie orale.

A diluer dans une eau de boisson à température d'environ 38°C, dans du lait ou un lactoremplacéur.

Quantités pour 2 litres d'eau de boisson : 100 g.

Faire boire ENERLYTE® Plus immédiatement après sa préparation.

Administer les buvées pendant 2 jours. Prolonger jusqu'à 7 jours si nécessaire.

- Veau

Administrer une buvée de 2 litres, 2 à 3 fois par jour. La reprise de l'alimentation habituelle se fera sans phase de transition.

- Porcelet sevré

La consommation quotidienne dépend de l'âge et du nombre de porcelets. Préparer des buvées de 2 à 4 litres et les renouveler afin de laisser boire le mélange à volonté.

Un mélange de 2 litres d'ENERLYTE® Plus apporte les quantités suivantes :

0,5.10<sup>10</sup> CFU d'*Enterococcus faecium* (E1705) ;

50 mg de sélénométhionine 3b8.11 (100-120 µg de sélénium).

**Précautions d'emploi:**

Tenir à l'abri de l'humidité.

Conserver hors de la portée des enfants.

---

Boe de 24 sachets de 100 g

GTIN : 03597132008624

---

**VIRBAC France**

Espace Azur Mercantour

3<sup>e</sup> rue LID

06510 CARROS

[www.virbac.fr](http://www.virbac.fr)

