

KAOPECTATE®



Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires :

Kaolin lourd 197,2 mg
Pectine 4,4 mg

Parahydroxybenzoate de méthyle (E218) 2,0 mg
Acide sorbique (E200) 1,0 mg
Excipient QSP 1 ml

Forme pharmaceutique:

Suspension buvable.

Espèce cibles:

Equins, bovins, ovins, porcins, chiens et chats.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles:

Chez les veaux, les poulains, les agneaux, les porcelets, les chiens et les chats :
- traitement adjuvant des diarrhées.

Contre-indications:

Non connues.

Mises en garde particulières à chaque espèce cible:

Aucune.

Précautions particulières d'emploi chez les animaux:

Aucune.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux:

Bien agiter avant emploi.

Autres précautions:

Aucune.

Effets indésirables (fréquence et gravité):

Non connus.

Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte:

L'innocuité de la spécialité chez les espèces cibles n'a pas été montrée. Toutefois, les substances actives étant peu absorbées, l'utilisation de ce médicament pendant la gestation ne devrait pas poser de problème particulier.

Interactions médicamenteuses et autres:

La spécialité peut interférer avec l'absorption d'autres médicaments administrés de manière concomitante.

Posologie:

Poulains et veaux : 60 ml

Agneaux : 10 à 20 ml

Porcelets : 3 à 5 ml

Chiens : 5 à 30 ml

Chats : 3 à 5 ml

Ces doses seront administrées 2 fois par jour et le traitement sera poursuivi pendant 3 à 5 jours.

voie d'administration:

Voie orale.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes):

Sans objet.

Temps d'attente:

Viande et abats : zéro jour.

Lait : zéro jour.

Propriétés pharmacodynamiques:

Le kaolin adsorbe les toxines d'origine bactérienne et les acides organiques résultant d'une maldigestion. Il prévient ainsi le flux d'eau et d'électrolytes dans la lumière intestinale.

La pectine protège la muqueuse intestinale et ralentit le transit digestif.

Caractéristiques pharmacocinétiques:

Non connues.

Incompatibilités:

Non connues.

Durée de conservation:

4 ans.

Précautions particulières de conservation selon pertinence:

Ne pas congeler.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments:

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant:

ZOETIS
23-25 avenue du Dr Lannelongue
75014 PARIS

Numéro d'autorisation de mise sur le marché et date de première autorisation:

FR/V/2731701 3/1990 - 01/10/1990

Classification ATC Vet:
QA07BC30

Flacon de 180 ml
GTIN : 05414736002415

Flacon de 480 ml
GTIN : 05414736002408

ZOETIS

23-25 avenue du Dr Lannelongue
75668 PARIS CEDEX 14
Tél : 01.58.07.30.00
Fax : 01.58.07.42.07

www.zoetis.fr

The Zoetis logo is rendered in a bold, orange, lowercase sans-serif font. The letter 'z' is stylized with a thick, curved underline that extends under the 'o'.