

# NUTRA B®



## Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires :

Thiamine<sup>1</sup> (sf de chlorhydrate) ..... 50,00 mg/ml  
Pyridoxine<sup>2</sup> (sf de chlorhydrate) ..... 50,00 mg/ml  
Nicotinamide<sup>3</sup> ..... 50,00 mg/ml  
Acide ascorbique ..... 50,00 mg/ml

Excipient QSP ..... 1 ml

<sup>1</sup> Vitamine B1

<sup>2</sup> Vitamine B6

<sup>3</sup> Vitamine B3/Vitamine PP

## Forme pharmaceutique:

Solution injectable.

## Espèce cibles:

Bovins, ovins, équins, porcins, chiens et chats.

## Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles:

Chez les bovins, ovins, équins, porcins, chiens et chats :  
- produit d'apport en vitamines.

## Contre-indications:

Aucune.

## Précautions particulières d'emploi chez les animaux:

Par voie intramusculaire, limiter le volume en chaque point (5 à 10 ml selon la taille).

Diluer le médicament vétérinaire en soluté salin ou glucosé avant son administration par voie intraveineuse chez le cheval, espèce chez laquelle toute autre voie est à proscrire, et par voie sous-cutanée chez les chiens et chats, afin d'éviter tout phénomène d'intolérance.

Pratiquer des injections intraveineuses très lentes en raison des réactions que peut engendrer la vitamine B1 par cette voie.  
Ne pas faire avaler.

## Effets indésirables (fréquence et gravité):

Par voie intraveineuse, des phénomènes d'intolérance peuvent être observés en raison de la présence de la vitamine B1.

Si vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres effets ne figurant pas sur cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire.

## Posologie:

Bovins adultes

20 à 30 ml par voie intramusculaire ou intraveineuse.

Equins adultes

20 à 30 ml par voie intraveineuse.

Veaux

10 ml par voie intramusculaire ou intraveineuse.

Poulains

10 ml par voie intraveineuse.

Ovins, porcins

5 à 10 ml par voie intramusculaire ou intraveineuse.

Chiens, chats

3 à 5 ml selon la taille par voie sous-cutanée.

Pratiquer deux injections à 24 heures d'intervalle.

**voie d'administration:**

Voies intramusculaire (bovins, ovins, porcins), sous-cutanée (chiens, chats), intraveineuse (équins, bovins, ovins, porcins).

**Temps d'attente:**

Viande et abats : zéro jour.

Lait : zéro heure.

**Durée de conservation:**

Durée de conservation après ouverture : 28 jours.

**Précautions particulières de conservation selon pertinence:**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Conserver à une température comprise entre +2°C et +8°C.

**Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments:**

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant:**

ZOETIS  
23-25 avenue du Dr Lannelongue  
75014 PARIS

**Numéro d'autorisation de mise sur le marché et date de première autorisation:**

FR/V/9202376 9/1992 - 17/02/1992

**Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance:**

À ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée au moins 5 ans.

Usage vétérinaire.

Respecter les doses prescrites.

**Classification ATC Vet:**

QA11EB

---

Flacon verre de 50 ml  
GTIN : 08714015010580

---

Coffret de 10 flacons verre de 50 ml  
GTIN :

---

ZOETIS

23-25 avenue du Dr Lannelongue  
75668 PARIS CEDEX 14  
Tél : 01.58.07.30.00  
Fax : 01.58.07.42.07

www.zoetis.fr

**zoetis**