

PHOSPHALUVET®



Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires :

Un g contient :

Substance active :

Phosphate daluminium 123,80 mg

Excipients :

Sorbate de potassium (E 202) 2,65 mg

Sorbitol (E 420) 150,00 mg

Forme pharmaceutique:

Gel oral.

Espèce cibles:

Chiens.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles:

Chez les chiens :

- traitement symptomatique des gastrites aiguës accompagnées ou non de vomissements.
- limitation des régurgitations et des vomissements en période postopératoire.

Contre-indications:

Non connues.

Mises en garde particulières à chaque espèce cible:

Aucune.

Précautions particulières d'emploi chez les animaux:

Agiter le flacon avant l'emploi.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux:

Se laver les mains après usage.

Autres précautions:

Aucune.

Effets indésirables (fréquence et gravité):

Non connus.

Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte:

L'innocuité de la spécialité chez les femelles en gestation ou en lactation n'a pas été étudiée. Cependant l'absorption de l'aluminium étant faible, son utilisation pendant la gestation et l'allaitement ne semble pas poser de problème particulier.

Interactions médicamenteuses et autres:

Le phosphate daluminium peut diminuer l'absorption d'autres médicaments.

Le produit est transparent aux rayons X.

Le produit ne capte pas les phosphates alimentaires et n'entraîne donc pas de déplétion phosphorée.

Posologie:

Administrer le produit soit directement dans la gueule, soit dans une faible quantité de nourriture à l'aide de la seringue doseuse.

- Gastrites aiguës

145 mg de phosphate d'aluminium par kg de poids corporel, soit 1 ml de gel (1 graduation de la seringue doseuse) par kg, matin, midi et soir, pendant 2 à 3 jours consécutifs.

- Régurgitations et vomissements

145 mg de phosphate d'aluminium par kg de poids corporel, soit 1 ml de gel (1 graduation de la seringue doseuse) par kg avant l'opération, puis 8 heures après et 3 fois par jour (matin, midi et soir) le lendemain de l'opération.

voie d'administration:

Voie orale.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes):

Non connu.

Temps d'attente:

Sans objet.

Propriétés pharmacodynamiques:

Le produit associe un colloïde minéral, le phosphate d'aluminium, à un gel organique, mélange de polysaccharides d'origine végétale. PHOSPHALUVET® présente les propriétés suivantes :

- pouvoir antiacide en modifiant rapidement et durablement le pH gastrique anormalement acide grâce à un fort pouvoir tampon. Cette action présente trois aspects : une capacité antiacide, un effet régulé préservant le rétrocontrôle de la sécrétion chlorhydrique et un effet prolongé supérieur au temps de vidange gastrique ;
- pouvoir couvrant en tapissant la muqueuse gastrique et en adhérant à celle-ci ;
- pouvoir cytoprotecteur en stimulant la synthèse de prostaglandines endogènes et la libération de radicaux sulfhydriles par la muqueuse gastrique. Le produit élève le pH à un degré suffisant pour réduire la mucolyse peptique.
- pouvoir antihémorragique en inhibant la fibrinolyse ;
- pouvoir d'adsorption en adsorbant les sels biliaires, les lysolécithines et les gaz digestifs.

Caractéristiques pharmacocinétiques:

Pas de données disponibles.

Incompatibilités:

Sans objet.

Durée de conservation:

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 3 ans.

Précautions particulières de conservation selon pertinence:

Pas de précautions particulières de conservation.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments:

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant:

BOEHRINGER INGELHEIM France
14 rue Jean Antoine de Baïf
75013 PARIS

Numéro d'autorisation de mise sur le marché et date de première autorisation:

FR/V/2356254 5/1993 - 08/01/1993

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance:

Usage vétérinaire.

Classification ATC Vet:

QA02AB03

Boe de 1 flacon de 250 g et de 1 seringue-doseuse de 5 ml
GTIN : 04028691511670

BOEHRINGER INGELHEIM France

Division Santé Animale
12, rue André Huet
51100 REIMS
Tél : 03.26.50.47.50
Fax : 03.26.50.47.43

infoveto@rei.boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.fr

