

## VÉTÉDINE® Solution



Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires :

Un ml contient :  
Substance active :  
Povidone iodée ..... 100 mg

### Forme pharmaceutique:

Solution pour application cutanée.

### Espèce cibles:

Équins, bovins, ovins, porcins, chiens et chats.

### Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles:

Chez les bovins, ovins, équins, porcins, chiens, chats :  
- antiseptie de la peau, des muqueuses et des sites opératoires.  
- traitement d'appoint des plaies infectées.

### Contre-indications:

Dermites à leur stade suintant.  
Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux principes actifs ou à l'un des excipients.

### Mises en garde particulières à chaque espèce cible:

Aucune.

### Précautions particulières d'emploi chez les animaux:

Les produits à visée antiseptique ne sont pas stérilisants, ils réduisent temporairement le nombre de micro-organismes.

### Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux:

En cas d'hypersensibilité connue à la povidone ou à l'iode, ne pas manipuler ce produit.

### Autres précautions:

Aucune.

### Effets indésirables (fréquence et gravité):

Non connus.

### Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte:

L'utilisation du médicament sera fonction de l'évaluation du rapport bénéfice/risque réalisée par le vétérinaire.

### Interactions médicamenteuses et autres:

Ne pas utiliser en même temps que des savons, solutions et pommades contenant des dérivés mercuriels.

### Posologie:

- Antiseptie de la peau et des sites opératoires et désinfection des plaies

Utiliser le produit pur en badigeonnage ou en irrigation.

- Antisepsie des muqueuses

Utiliser le produit dilué (1 à 2 cuillerées à soupe par litre d'eau bouillie tiède) en gynécologie, pour l'hygiène de la mamelle durant la lactation.

**voie d'administration:**

Usage externe.

**Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes):**

Sans objet.

**Temps d'attente:**

Bovins, ovins et équins :

- viande et abats : zéro jour.

- lait : zéro jour.

Porcins :

- viande et abats : zéro jour.

**Propriétés pharmacodynamiques:**

Le produit est une solution aqueuse de povidone iodée, elle possède les propriétés antiseptiques et antimycosiques de liode. Elle est également active sur les formes sporulées des bactéries, levures et champignons.

**Caractéristiques pharmacocinétiques:**

Labsorption de la povidone iodée par la peau et les muqueuses est pratiquement nulle.

Au contact des tissus et des muqueuses, le complexe povidone iodé se dissocie et libère lentement liode prolongeant ainsi l'activité du produit.

**Incompatibilités:**

Non connues.

**Durée de conservation:**

3 ans.

**Précautions particulières de conservation selon pertinence:**

Pas de précautions particulières de conservation.

**Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments:**

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant:**

VETOQUINOL  
MAGNY VERNOIS  
70200 LURE

**Numéro d'autorisation de mise sur le marché et date de première autorisation:**

FR/V/4576889 5/1992 - 19/06/1992

**Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance:**

Accessible aux groupements agréés en production bovine, porcine et ovine.  
Médicament à usage vétérinaire.

**Classification ATC Vet:**

QD08AG02

---

Flacon de 120 ml  
GTIN : 03605870001385

---

Flacon de 1 litre  
GTIN : 03605870001392

---

Laboratoire VETOQUINOL S.A.

70204 LURE CEDEX  
Direction France  
31, rue des Jeûneurs  
75002 PARIS  
Tél : 01.55.33.50.25  
Fax : 01.47.70.42.05

[www.vetoquinol.fr](http://www.vetoquinol.fr)

**Vétoquinol**  
 *Signe de Passion*