

CLINAFARM™ Spray

Date de création : 30-11--0001

Date de mise à jour : 19-12-2017

Informations produit

Type de préparation

Biocide TP3.

Les utilisations autorisées

Traitement fongicide des logements d'animaux domestiques.

CLINAFARM™ Spray contient de l'énilconazole, fongicide synthétique à large spectre. L'énilconazole est une molécule active sur *Aspergillus fumigatus* et d'autres champignons comme les dermatophytes.

Indications d'utilisation :

Destiné à la désinfection antifongique pour :

- les couvoirs de volailles, pour prévenir et traiter des contaminations par *Aspergillus fumigatus* : incubateurs, éclosiers et leurs salles attenantes ainsi que les salles de préparation des poussins.
- les bâtiments d'élevage de lapins infectés par des dermatophytoses (*Microsporum canis*)
- les stabulations, bâtiments de volailles ou autres locaux contaminés par des dermatophytes (*Aspergillus fumigatus*, *Trichophyton mentagrophytes*, *T. equinum*, *Microsporum canis*).

Mode d'emploi et dose à appliquer pour chaque usage autorisé

Dosage et méthode d'application :

CLINAFARM™ Spray s'utilise à une dilution de 1% soit 1 litre de CLINAFARM™ Spray dans 99 litres d'eau. Il est préférable que l'eau ait une température de 45°C. Le dosage normal est de 20 mg d'énilconazole par m² de surface en pulvérisation. Pour une application en sprayage, préparer 10 litres de solution (dilution de 1 : 100 ou 0,15%) pour 750 m². Pour une application en nébulisation, préparer 10 litres de solution (dilution de 1 : 100 ou 0,15%) pour 3 000 m³. Après la nébulisation, il est recommandé de maintenir les locaux fermés pendant au moins 4 heures.

Protocoles de traitement :

Dans les couvoirs de volailles :

En cas d'infection à *Aspergillus* avérée :

- Dans les couvoirs où la contamination par *Aspergillus* est la cause d'aspergillose clinique, la totalité du couvoir doit être désinfectée. Il est conseillé de traiter pendant au moins un mois ; un traitement du matériel est nécessaire après chaque utilisation.
- Les incubateurs : Désinfecter les parois et les portes en pulvérisant directement CLINAFARM™ Spray (10 litres de solution reconstituée pour 750 m²) avant le chargement.
- Les éclosiers : Désinfecter les parois et les portes en pulvérisant directement CLINAFARM™ Spray (10 litres de solution reconstituée pour 750 m²) avant le chargement.
- Les salles d'incubation, d'éclosions et de préparation des poussins : Appliquer CLINAFARM™ Spray par nébulisation dans toutes les pièces en utilisant 10 litres de solution reconstituée pour 3000 m³. Renouveler à raison de deux applications par semaine pour la décontamination des salles.

En prévention d'infection à *Aspergillus* :

- Dans les éclosiers : Désinfecter les parois et les portes avec CLINAFARM™ Spray (10 litres de solution reconstituée pour 750 m²) avant le chargement.
- La salle d'éclosion et de préparation des poussins : Appliquer CLINAFARM™ Spray en nébulisation dans toutes les pièces à raison de 10 litres de solution reconstituée pour 3000 m³.

Dans les élevages de lapins :

Utiliser CLINAFARM™ Spray soit en pulvérisation ou en nébulisation. Une désinfection associée à un nettoyage minutieux est absolument nécessaire.

Dans les autres locaux dont stabulation et bâtiment pour volailles :

Utiliser CLINAFARM™ Spray soit en pulvérisation soit en nébulisation. Le traitement peut être répété s'il y a un risque de recontamination.

L'identité de toute substance active biocide contenue dans le produit et sa concentration en unités métriques

Émulsion à diluer pour solution à pulvériser contenant 150 g d'énilconazole par litre (15% m/m) (CAS n°35554-44-0)

Précautions d'emploi

DANGER. Liquide et vapeurs inflammables. Nocif en cas d'ingestion. Provoque une irritation cutanée. Provoque des

lésions oculaires graves. Nocif par inhalation. Susceptible de provoquer le cancer. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Élimination en toute sécurité du produit biocide et de son emballage

Éliminer le contenu et récipient conformément à la réglementation locale.

Des indications concernant les mesures de précaution à prendre pendant l'utilisation, le stockage et le transport

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Éviter de respirer les brouillards, les vapeurs et les aérosols. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique, de ventilation, d'éclairage antidéflagrant. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'incendie : utiliser le moyen approprié pour l'extinction.

Interaction avec les autres produits : CLINAFARM™ Spray peut être mélangé avec d'autres désinfectants (qui ne possèdent pas de propriétés oxydantes).

Conservation : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Tenir hors de la portée des enfants.

Présentations

Présentation et quantité

Flacon de 1 litre

Code GTIN : 05420036904038

Laboratoire



ELANCO FRANCE
24, boulevard Vital Bouhot
92200 NEUILLY SUR SEINE
Tél : 01.55.49.35.29
Fax : 01.55.49.36.70
<http://www.elanco.fr>