

BUTOX[®] 50 pour mille

Date de création : 08-11-2017

Date de mise à jour : 19-10-2020

Informations et posologie

Espèces cibles



Espèce cible complément

Bovins et ovins.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles

Chez les bovins et ovins :

- prévention et traitement des infestations par parasites externes suivants : mouches, tiques, poux, mélophages et gales.

Administration

Voie d'administration



Voie d'administration complément

Usage externe.

Posologie

- Chez les bovins et les ovins, utiliser le produit en dilution dans l'eau selon les concentrations suivantes :

Doses d'utilisation :

Indications	Traitement en pulvérisation bovins/ovins	Rythme de traitement
	Quantité de Butox 50 pour mille pour 10 l d'eau	
Gales (50 ppm)	10 ml	Préventif : 1 seul traitement Curatif : 2 traitements à 10 jours d'intervalle
Tique, mouches (25 ppm)	5 ml	2 premiers traitements à 15 jours d'intervalle puis renouveler selon le degré d'infestation
Poux, mélophages (12,5 ppm)	2,5 ml	1 seul traitement suffit, en général

Effectuer un premier mélange en ajoutant à une petite quantité d'eau (5 litres par exemple) la quantité de produit à utiliser.

Bien agiter puis compléter avec la quantité d'eau nécessaire.

Appliquer le produit en pulvérisation en insistant plus particulièrement sur les sites de prédilection des parasites.

- Recommandations

Si les animaux présentent des lésions importantes, il est préférable de pulvériser de l'eau tiède et d'effectuer un brossage sur les zones atteintes, avant de traiter.

Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires

Un mL contient :

- Substance active :
Deltaméthrine 50 mg

- Excipient QSP 1 mL

Principes actifs / Molécule

Deltaméthrine

Forme pharmaceutique

Solution

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance

Usage vétérinaire.

À ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée au moins cinq ans.

Temps d'attente

Toutes cibles :

Bovins, ovins :

- viande et abats : 28 jours.
- lait : 24 heures.

Propriétés

Propriétés pharmacodynamiques

La deltaméthrine, molécule de la famille des pyréthroïdes de synthèse, se caractérise par son activité acaride et insecticide ; agissant en modifiant la perméabilité des canaux sodiques, la molécule provoque une hyperexcitation, suivie d'une paralysie (effet choc), de tremblements et de mortalité des parasites.

Propriétés pharmacocinétiques

Après application cutanée, la deltaméthrine est très peu absorbée et reste, sur la peau et le pelage, active sur les parasites. Le produit est majoritairement excrété chez les bovins et les ovins dans les fèces.

Mise en garde

Contres-indications et mise en garde

Contre-indications

Aucune connue.

Mises en gardes particulières à chaque espèce cible

Toutes cibles :

Aucune.

Effets indésirables (fréquence et gravité)

Non connus.

Précautions d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Avant de commencer à baigner les animaux, bien agiter le mélange.

Les 10 premiers animaux devront être re-baignés.

Les animaux ne devront être ni fatigués ni assoiffés.

Il est conseillé de ne pas baigner les animaux pendant les heures de chaleur excessive.

Si les animaux présentent des lésions importantes, il est préférable de pulvériser de l'eau tiède et d'effectuer simultanément un brossage sur les zones atteintes, avant de traiter.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Éviter le contact direct du produit avec la peau et les muqueuses. Il est conseillé de porter des gants lors de l'utilisation du produit.

Ne pas manger, ni fumer, ni boire, lors de l'utilisation du produit.

Se laver les mains et les zones de peau exposées au produit avant de manger et après l'administration.

Éviter d'inhaler le produit et en particulier : Veiller à ne pas effectuer le traitement sous le vent. Il est conseillé de faire ce traitement à l'intérieur des bâtiments.

En cas de contamination des yeux ou des muqueuses, rincer abondamment avec de l'eau claire.

En cas d'ingestion accidentelle du produit : ne pas tenter de faire vomir, mais appeler immédiatement, muni de l'étiquette, un médecin ou le centre antipoison le plus proche.

Autres précautions

Ne pas épandre les eaux résiduelles dans les fossés, mares et cours d'eau ni près des sources et des puits.

Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte

Les études chez les animaux de laboratoire (rats, lapins) n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène ou embryotoxique. L'innocuité du médicament vétérinaire n'a pas été établie en cas de gravidité ou de lactation.

L'utilisation de la spécialité chez les femelles en gestation ou en lactation devra faire l'objet d'une évaluation du rapport bénéfique/risque par le vétérinaire.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes)

Non connu.

Précautions pharmacologiques

Interactions médicamenteuses et autres

Ne pas associer avec des insecticides organophosphorés, ceux-ci pouvant interférer sur le métabolisme de la deltaméthrine et abaisser le seuil de toxicité de la molécule.

Incompatibilités

Non connues.

Conservation

Durée de conservation

3 ans.

Précautions particulières de conservation selon pertinence

Aucune.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

La spécialité peut être toxique pour les poissons et les organismes aquatiques. Ne pas verser dans les cours d'eau et les fossés.

Présentation

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant

INTERVET
Rue Olivier de Serres
CS 17144
49071 BEAUCOUZE cedex

Classification ATC Vet

- QP53AC11

Laboratoire



MSD Santé Animale
Rue Olivier de Serres
B.P. 17144
49071 BEAUCOUZE CEDEX
Tél : 02.41.22.83.83
Fax : 02.41.22.83.00
<http://www.msd-sante-animale.fr>

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

FR/V/6944916 3/1986

Date de première autorisation

1986-10-10

Présentation et quantité

BUTOX[®] 50 pour mille Flacon verre de 50 mL

Code GTIN : 08713184043740

BUTOX[®] 50 pour mille Bidon aluminium de 1 litre

Code GTIN : 08713184043757